

Do not use if vial is leaking, solution is cloudy or contains undissolved particles.
To be administered by Slow I.V. infusion over a period of 30 to 120 minutes.

NEZOCIN SUSPENSION:

Nezocin Oral Suspension is supplied as banana-flavored powder for constitution into a suspension for oral administration. Following re-constitution, each 5 ml contains 100 mg of Linezolid. Add a little boiled & cooled water invert bottle and shake until all powder is dispersed, then slowly add more water up to the mark on the label. Shake well before use. When stored at room temperature discard unused portion after 21 days.

NEZOCIN TABLETS 600mg:

Nezocin Tablet 600mg is a red colored oblong shaped containing 600mg Linezolid. It is given as one tablet twice daily with water or juice for various indication (given in above table)

CONTRAINDICATIONS:

Nezocin(Linezolid) formulations are contraindicated for use in patients who have known hypersensitivity to Linezolid or any of the other product components.

SIDE-EFFECTS:

Nezocin(Linezolid) is very well tolerated with relative few side effects which include headache, insomnia, convulsions, dizziness, vertigo, dermatologic rash, pharyngitis, diarrhea, vomiting, nausea, generalized and localized abdominal pain, GI bleeding, loose stools, constipation, altered taste, tongue discoloration, oral moniliasis, vaginal moniliasis, anemia, thrombocytopenia, thrombocytopenia, eosinophilia, leucopenia, pancytopenia, Hypokalemia, generalized edema & lactic acidosis.

DRUG INTERACTION

- Adrenergic agents (eg, dopamine, epinephrine)
- Effects may be enhanced by Nezocin(Linezolid)
- Serotonergic agents (eg, fluoxetine)
- Possible increased risk of serotonin syndrome.

PRECAUTIONS

Pregnancy:

Category C. Nezocin(Linezolid) should be used during pregnancy only if the potential benefit justifies the potential risk to the fetus.

Lactation:

It is not known whether Nezocin(Linezolid) is excreted in human milk. Because many drugs are excreted in human milk, caution should be exercised when Nezocin(Linezolid) is administered to a nursing woman.

Elderly:

No overall differences in safety or effectiveness of Nezocin(Linezolid) were observed between these patients and younger patients.

STORAGE:

Store at temperature 15 to 30 °C away from light & moisture.

PRESENTATION:

NEZOCIN INFUSION:

Nezocin (Linezolid) Infusion is available in 100ml glass vial.

NEZOCIN 600mg INFUSION:

Nezocin (Linezolid) Infusion 600mg is available in 300ml glass vial.

NEZOCIN TABLETS 600mg:

Nezocin(Linezolid) Tablets are available in 12 Tablets Blister Packing.

NEZOCIN SUSPENSION:

Nezocin(Linezolid) Suspension 60ml is available in amber glass bottle as dry powder.

ہدایات اور استعمال:

نیوزین آئی وی انفیوژن اور نیوزین سسپنشن کی بچوں میں خوراک 10 ملی گرام/کلوگرام جسمانی وزن سے اور بڑوں میں 400 سے 600 ملی گرام انفیکشن کی ذمیت کے مطابق 10-14 دن تک صبح اور شام دینا چاہیے۔

نیوزین انفیوژن

آئی وی انفیوژن کو 30 سے 120 منٹ میں درپیش دینا چاہیے۔ انفیوژن کو کسی بھی عام ڈرپ میں بھی دیا جاسکتا ہے

نیوزین ٹیبلیٹس 600 ملی گرام

ایک گولی صبح اور ایک گولی شام عمومی خوراک ہے۔

نیوزین سسپنشن

نیوزین سسپنشن کو کیلے کے قیوڈ میں بنایا گیا ہے۔ بوتل کے لیبل پر دیئے گئے نشان تک ابلا ہوا ٹھنڈا پانی ملا کر اچھی طرح ہلائیں تاکہ سسپنشن بن جائے۔

ہر بار بوتل کا اچھی طرح ہلائیں۔ ایک دفعہ سسپنشن بنانے کے بعد اگر کمرے کے درجہ حرارت پر رکھا گیا ہو تو 21 دن تک استعمال کر سکتے ہیں اسکے بعد بقیہ سسپنشن کو ضائع کر دیں

اسٹوریج:

15 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر روشنی اور نمی سے بچا کر رکھیے۔

وائل کے لیک ہونے، دھندلا ہونے یا اس میں نیمرٹل پذیر ذرات نظر آنے کی صورت میں ہرگز استعمال نہ کریں۔
آئی وی انفیوژن مرلیٹس کے جسم میں 30 سے 120 منٹ کے دوران داخل کیا جائے۔

brookes

Manufactured by:

Brookes Pharma Private Limited
58 - 59 Sector 15 Korangi Industrial Area
Karachi 74900 Pakistan.

